

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 XELOX療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネツビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
3	ブドウ糖液5%250mL オキサリプラチン点滴	1B 130mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
4	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
5	ゼロータ錠300 (カシタピン)	2000mg/m ²	1日2回朝・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 XELOX+BV療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
2	生理食塩液100mL ベバシズマブBS点滴	1B 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分3回目以降30分	↓																				
3	ブドウ糖液5%250mL オキサリプラチン点滴	1B 130mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
4	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
5	ゼローダ錠300 (カペンシピン)	2000mg/m ²	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 IRIS療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネツビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
2	ブドウ糖液5%250mL イリノテカン点滴	1B 150mg/m ²	点滴	90分	↓																				
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
4	エスワン配合錠	80~120mg /body	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 IRIS+BV療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	27	28
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓														↓						
2	生理食塩液100mL ベバシズマブBS点滴	1B 5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分3回目以降30分	↓														↓						
3	ブドウ糖液5%250mL イリノテカン点滴	1B 100mg/m ²	点滴	90分	↓														↓						
4	生理食塩液100mL	1B	点滴	400mL/h	↓														↓						
5	エスワン配合錠	80~120mg /body	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 SOX療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
2	ブドウ糖液5%250mL オキサリプラチン点滴	1B 130mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
3	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
4	エスワン配合錠	80~120mg /body	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 SOX+BV療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタン) テキサト注3.3mg (テキサメタン) アロリス点滴静注235mg (ホスネビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
2	生理食塩液100mL ベバシズマブBS点滴	1B 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分3回目以降30分	↓																				
2	ブドウ糖液5%250mL オキサリプラチン点滴	1B 130mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
3	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
4	エスワン配合錠	80~120mg /body	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 XELIRI療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネツビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
3	ブドウ糖液5%250mL イリノテカン点滴	1B 200mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
4	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
5	ゼロータ錠300 (カシタピン)	2000mg/m ²	1日2回朝・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

適応癌種 結腸直腸癌
 レジメン名 XELIRI + BV療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	パロセトロン点滴0.75mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタゾン) テキサト注3.3mg (テキサメタゾン) アロカリス点滴静注235mg (ホスネビタント)	1B 1V 1A 1V	点滴	100mL/h	↓																				
2	生理食塩液100mL ベバシズマブBS点滴	1B 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分3回目以降30分	↓																				
3	ブドウ糖液5%250mL イリノテカン点滴	1B 200mg/m ²	点滴	2時間	↓																				
4	ブドウ糖液5%100mL	1B	点滴	400mL/h	↓																				
5	ゼローダ錠300 (カシタピン)	2000mg/m ²	1日2回朝 ・夕食後		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							

