

適応癌種 頭頸部癌  
 レジメン名 Cetuximab+PTX療法（初回）

催吐性リスク 軽度  
 1コースの期間 7日

Rp	商品名（一般名）	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液100mL デキサト注6.6mg（デキサメタゾン） ホラミン注5mg（ホルフェエラミン） ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A 1A	点滴	100mL/h	↓						
2	生理食塩液250mL アービタックス点滴（セツキシマブ）	1B 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	↓						
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	100mL/h	↓						
4	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	↓						
5	生理食塩液100mL	1B	点滴	200mL/h	↓						

適応癌種 頭頸部癌  
 レジメン名 Cetuximab+PTX療法 (2回目以降)

催吐性リスク 軽度  
 1コースの期間 7日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液100mL デキスト注6.6mg (デキサメタゾン) ホラミン注5mg (ホルフェエラミン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A 1A	点滴	100mL/h	↓						
2	生理食塩液250mL アービタックス点滴 (セツキシマブ)	1B 250mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	↓						
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	100mL/h	↓						
4	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	↓						
5	生理食塩液100mL	1B	点滴	200mL/h	↓						