

適応癌種 乳癌
 レジメン名 weekly PTX+BV療法

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	グラネキソン点滴1mg50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
2	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
3	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 90mg/m ²	点滴	1時間	↓							↓							↓						
4	生理食塩液100mL ベバシズマブBS点滴	1B 10mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分3回目以降30分	↓														↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
6	レスタミンコ-7錠10mg (ジフェントラミン)	5錠	内服		↓							↓							↓						

適応癌種 乳癌
レジメン名 weekly Trastuzumab BS療法 (初回)

催吐性リスク 最小度
1コースの期間 7日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓						
2	生理食塩液250mL トラスツズマブBS注射用	1B 4mg/kg	点滴	90分	↓						
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓						

適応癌種	乳癌	催吐性リスク	最小度
レジメン名	weekly Trastuzumab BS療法 (2回目以降)	1コースの期間	7日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓						
2	生理食塩液250mL トラスツズマブBS注射用	1B 2mg/kg	点滴	30分	↓						
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓						

適応癌種 乳癌
 レジメン名 weekly PTX療法

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 7日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7
1	グラネセロン点滴1mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓						
2	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓						
3	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m ²	点滴	1時間	↓						
4	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓						
5	レスタミンコ-ワ錠10mg (ジフェンヒドラミン)	5錠	内服		↓						

適応癌種 乳癌
 レジメン名 nab-PTX+Atezolizumab療法

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓														↓						
2	生理食塩液250mL テセントリク注(アテゾリスマブ)	1B 840mg/body	点滴	1時間	↓														↓						
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
4	生理食塩液50mL アブラキサン(ハクリタセルアルミン懸濁液)	1B 100mg/m ²	点滴	30分	↓							↓							↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						

適応癌種 乳癌
 レジメン名 PTX+CBDCA+Pembrolizumab療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓																				
2	生理食塩液100mL キトルダ点滴 (ヘムブリスマブ)	1B 200mg/body	点滴	30分	↓																				
3	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓																				
4	パロセトン点滴0.75mg50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) デキサト注3.3mg (デキサメタゾン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A 1A	点滴	100mL/h	↓																				
5	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h								↓							↓						
6	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
7	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m ²	点滴	1時間	↓							↓							↓						
8	生理食塩液250mL カルボプラチン注射液	1B 5AUC (最大750mg)	点滴	1時間	↓																				
9	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
10	メスタミン7錠10mg (ジフェントラミン)	5錠	内服		↓							↓							↓						

適応癌種 乳癌
 レジメン名 PER+Trastuzumab+weekly PTX療法 (初回)

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓																				
2	生理食塩液250mL パージェタ点滴 (ヘルツマブ)	1B 840mg/body	点滴	1時間	↓																				
3	生理食塩液250mL トラスツズマブBS注射用	1B 8mg/kg	点滴	90分	↓																				
4	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
6	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m ²	点滴	1時間	↓							↓							↓						
7	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
8	メスタミンコ-ワ錠10mg (シフェンヒドラミン)	5錠	内服		↓							↓							↓						

適応癌種 乳癌
 レジメン名 PER+Trastuzumab+weekly PTX療法 (2回目以降)

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 21日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液50mL	1B	点滴	600mL/h	↓																				
2	生理食塩液250mL パージェタ点滴 (ヘルツマブ)	1B 420mg/body	点滴	30分	↓																				
3	生理食塩液250mL トラスツズマブBS注射用	1B 6mg/kg	点滴	30分	↓																				
4	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
6	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 80mg/m ²	点滴	1時間	↓							↓							↓						
7	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
8	メスタミンコ-ワ錠10mg (シフェンヒドラミン)	5錠	内服		↓							↓							↓						