

適応癌種 卵巣癌
 レジメン名 GEM療法

催吐性リスク 軽度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	生理食塩液50mL テキサト注6.6mg (テキサメタン)	1B 1V	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
2	ブドウ糖液5%100mL ゲムシタビン点滴	1B 1000mg/m ²	点滴	30分	↓							↓							↓						
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	400mL/h	↓							↓							↓						

適応癌種 子宮頸癌・卵巣癌
 レジメン名 CPT-11療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	...	27	28
1	ゲラニトロン点滴1mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメゾン) テキサト注3.3mg (テキサメゾン)	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
3	ブドウ糖液5%250mL イリノテカン点滴	1B 100mg/m ²	点滴	90分	↓							↓							↓						
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	400mL/h	↓							↓							↓						

適応癌種 子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌
 レジメン名 weekly TC療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	グラネヒロン点滴1mg50mL テキサト注6.6mg (テキサメタン) ファモチジン注20mg20mL	1B 1V 1A	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
2	生理食塩液50mL	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
3	ブドウ糖液5%250mL パクリタキセル注	1B 60mg/m ²	点滴	1時間	↓							↓							↓						
4	生理食塩液250mL カルボプラチン注射液	1B 2AUC	点滴	1時間	↓							↓							↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
6	メスタミンコ-ワ錠10mg (ジフェントラミン)	5錠	内服		↓							↓							↓						

