

適応癌種 膵癌
 レジメン名 GEM+nab-PTX療法

催吐性リスク 中等度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	グラネキソン点滴1mg50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン)	1B 1V	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
2	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
4	生理食塩液50mL アブラキサン点滴	1B 125mg/m ²	点滴	30分	↓							↓							↓						
5	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						
6	ブドウ糖液5%100mL ゲムシタビン点滴	1B 1000mg/m ²	点滴	30分	↓							↓							↓						
7	生理食塩液50mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						

適応癌種 膵癌・胆道癌
 レジメン名 GEM療法

催吐性リスク 最小度
 1コースの期間 28日

Rp	商品名 (一般名)	投与量	投与方法	投与速度	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	26	27	28
1	生理食塩液50mL デキサト注6.6mg (デキサメタゾン)	1B	点滴	100mL/h	↓							↓							↓						
2	ブドウ糖液5%100mL ゲムシタビン点滴	1B 1000mg/m ²	点滴	30分	↓							↓							↓						
3	生理食塩液100mL	1B	点滴	200mL/h	↓							↓							↓						